

PROMEDIO DE LOS RESULTADO DE LOS INDICADORES DE LA EPS SOS				
Efectividad				
Nombre del indicador	Resultado EPS SOS Octubre	Resultado EPS SOS Noviembre	Resultado EPS SOS Diciembre	Total País
Razón de Mortalidad Materna a 42 días	114	0	0	52.89
Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	8%	9%	9%	9.14%
Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)	8	4	6	10.36
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)	0	0	0	4.7
Tasa de mortalidad en menores de 5 años Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	0	0	0	18.83
Proporción de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 5 que inicial diálisis cronica programada	25%	42,85%	33,33%	35.84%
Gestión del Riesgo				
Proporcion de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	85%	87%	83%	78.86%
Proporcion de gestantes a la fecha de corte positivas para virus de inmunodeficiencia humana con TAR (Terapia Antiretroviral)	100%	100%	100%	93.7%
Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	82,68%	85,22%	81,99%	90.13%
Proporción de niños con diagnostico de Hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	0%	0%	0%	23,23%
Captación de hipertensión arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años	46	46,03%	46,35%	31.52%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados	80,84%	80,92%	81,14%	60.86%
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	109,43%	109,77%	100,52%	61.63%
Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en el ultimo semestre)	78,88%	51,11%	78,54%	50.33%
Proporción de pacientes diabéticos controlados (del total de diabéticos)	53,32%	48,50%	49,17%	16.88%
Tiempo Promedio entre la remisión de mujeres con diagnostico presuntivo de cancer de mama y la confirmación del diagnostico de cancer de mama de casos incidentes	-	-	58 Días	131
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de mama	-	-	11 Días	5
Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	83,82%	84,53%	83,57%	10,60%
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	0,44	0,22	0,22	6.96
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de cuello uterino	-	-	86 Días	69.94
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de Próstata	-	-	43 Días	74.9
Indicadores de Calidad				
Nombre del indicador	Resultado EPS SOS Octubre	Resultado EPS SOS Noviembre	Resultado EPS SOS Diciembre	Total País
Consulta de primera vez por medicina general	2,54	2,35	2,10	3,44
Consulta de primera vez por odontología general	4,10	3,75	2,70	4,38
Consulta de primera vez por ginecologia	22,55	30,09	21,70	10,14
Consulta de primera vez por especialista en cirugía general	37,70	30,46	20,00	12,77
Consulta de primera vez por especialista en pediatría	11,40	12,78	8,00	8,8
Consulta de primera vez por especialista en medicina interna	30,39	23,80	18,20	12,03
Consulta de primera vez por obstetricia	10,44	9,86	10,20	8,4