PROMEDIO DE LOS RESULTADO DE LOS INDICADORES DE LA EPS SOS				
Efectividad				
Nombre del indicador	**Resultado EPS SOS Abril**	**Resultado EPS SOS Mayo**	**Resultado EPS SOS Junio**	**Total País**
Razón de Mortalidad Materna a 42 días	0	0	22,75	52.89
Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	9,01%	9,10%	8,92%	9.14%
Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)	7,04%	7,00%	7,05%	10.36
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)	0	0	2,03	4.7
Tasa de mortalidad en menores de 5 años Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)	0	0	0	18.83
Proporción de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 5 que inicial diálisis cronica programada	34,9%	34,9%	35,0%	35.84%
Gestión del Riesgo				
Proporcion de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	89,17%	87%	83%	78.86%
Proporcion de gestantes a la fecha de corte positivas para virus de inmunodeficiencia humana con TAR (Terapia Antiretroviral)	100%	100%	80%	93.7%
Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	90,37%	90,71%	88,11%	90.13%
Proporción de niños con diagnostico de Hipotiroidismo congenito que reciben tratamiento	0%	0%	0%	23,23%
Captación de hipertensión arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años	43,40%	44,27%	46,22%	31.52%
Porcentaje de pacientes hipertensos controlados	78,37%	77,28%	69,01%	60.86%
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	102,45%	103,60%	109,15%	61.63%
Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en el ultimo semestre)		51,11%	78,54%	50.33%
Proporción de pacientes diabéticos controlados (del total de diabéticos)	45,13%	43,30%	46,41%	16.88%
Tiempo Promedio entre la remisión de mujeres con diagnostico presuntivo de cancer de mama y la confirmación del diagnostico de cancer de mama de casos incidentes	-	-	41 Días	131
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de mama	-	-	65 Días	49,7
Porcentaje de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	93,26%	91,47%	92,93%	10,60%
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	4,2	4,86	5,52	6.96
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de cuello uterino	-	-	65 Días	47,3
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento en cancer de Próstata	-	-	64 Días	64,5
Indicadores de Calidad				
Nombre del indicador	**Resultado EPS SOS Abril**	**Resultado EPS SOS Mayo**	**Resultado EPS SOS Junio**	**Total País**
Consulta de primera vez por medicina general	3,45	3,46	3,08	3,44
Consulta de primera vez por odontología general	3,01	2,87	2,95	4,38
Consulta de primera vez por ginecologia	10,75	8,65	11,29	10,14
Consulta de primera vez por especialista en cirugía general	12,58	7,60	10,13	12,77
Consulta de primera vez por especialista en pediatría	8,23	7,68	8,17	8,8
Consulta de primera vez por especialista en medicina interna	8,45	10,00	7,51	12,03
Consulta de primera vez por obstetricia	6,71	6,21	6,62	8,4